

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ. ПЕДИАТРИЯ

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ПАЦИЕНТОВ С ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ

Голощапова Н.И., Маслова А.М., Милюкина Ю.В.

Научный руководитель: Лебедева О.П.

Белгородский государственный национальный исследовательский
университет, кафедра акушерства и гинекологии

Актуальность проблемы: число беременных данной группы неуклонно растет из-за значительного увеличения числа операций кесарево сечения во всем мире; родоразрешение этой группы пациенток сопровождается массивным, угрожающий жизни кровотечением; характеризуется тяжелыми материнскими и перинатальными осложнениями.

Цель исследования: изучить исходы беременности и родов у пациенток с предлежанием плаценты у женщин жительниц Белгородской области.

Материал и методы: за 2010-2011 гг. в Перинатальном центре Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа нами были проанализированы истории болезней с предлежанием плаценты с последующей статистической обработкой.

Результаты и обсуждение: за 2 года было проведено 10 284 родов, из них с предлежанием плаценты – 69 случаев, что составляет 0,7%.

Корреляционный анализ:

Умеренная достоверная корреляционная связь:

1. Экстрагенитальная патология и срок родоразрешения ($R=-0,527$; $p<0,01$);
2. Вид предлежания (центральное) и кровопотеря ($R=-0,39$; $p<0,01$).

Слабая достоверная корреляционная связь:

1. Пол ребенка (девочки) и кровопотеря ($R=0,27$; $p<0,05$);
2. Паритет родов и кровопотеря ($R=0,27$; $p<0,05$);
3. Паритет беременности и кровопотеря ($R=0,25$; $p<0,05$);
4. Вес и кровопотеря, рост и кровопотеря ($R=-0,27$; $p<0,01$).

Выводы:

1. Частота родов с предлежанием плаценты у женщин Белгородской области увеличивается (2010 г. – 0,6%; 2011 г. – 0,7%);
2. Большую часть занимает центральное предлежание (84%);
3. Наиболее часто предлежание плаценты встречается у повторнобеременных (71%);

Течение беременности и родов при предлежании плаценты характеризуется высоким процентом осложнений (кровотечение в 100% случаев).